

Recomendaciones de aplicación del :

Inóculo micorrízico de *Boletus edulis* en formato polvo

Formato Bolsa de 100 y 200 g de inóculo en polvo

Dosis 100 g: 12 árboles - 8 g por árbol a razón de 2 g por punto
200 g: 50 árboles - 4 g por árbol a razón de 1 g por punto

¿En qué especies? Castaños, robles, encinas, alcornocques, abedules, hayas, pinos y abetos

Época de aplicación La mejor época es el comienzo del otoño y primavera (agosto a octubre y abril a junio)


Instrucciones de uso:

- PASO 1** En la proyección de la copa de cada árbol sobre el suelo establecer 4 puntos **A, B, C y D**
- PASO 2** En estos puntos levantar la cobertura superficial y hacer un pequeño hoyo de unos 10-20 cm de profundidad y 15-25 cm de diámetro.
- PASO 3** Rellenar aproximadamente la mitad de este hoyo de sustrato de micorrización o un sustrato poroso y ligeramente ácido.
- PASO 4** Espolvorear la dosis correspondiente de **MICOSPORA** sobre el sustrato (2 g o 1 g según sea **MICOSPORA** 100 o 200g)
- PASO 5** Tapar con sustrato hasta cerca de la superficie y cubrir con la cobertura retirada al principio del proceso.
- PASO 6** Aplicar un riego somero para humedecer el punto de inoculación.



MICO Spora
Boletus edulis

PASO 1



PASO 2

10 - 20 cm de profundidad



PASO 3 y 4

2g: una cucharadita de café



PASO 5



PASO 6

Especificaciones generales:



Tiempo de producción

Los plazos son flexibles. Es complejo definirlos debido a que influyen una multitud de factores (orientación, tipo de terreno, temperatura, humedad, vegetación, competencia con otros hongos ...) No obstante, se establece que en condiciones óptimas las primeras setas se empezarán a recolectar a los 2 - 3 años.



Recomendaciones

Aplicar sobre plantas de 8 a 30 años de edad. Se debe podar para favorecer la entrada de luz y así fomentar la fructificación de las setas. En caso de sequía prolongada durante las dos semanas siguientes a la inoculación se recomienda humedecer los puntos de micorrización. No aplicar fungicidas ni abonos muy ricos en fósforo que puedan interferir en la micorrización. No arar las zonas micorrizadas en los años siguientes



Conservación

Guardar en un espacio fresco y seco, hasta 2 años desde su recepción.
Una vez disuelto emplear en el momento



www.hifasforesta.com



info@hifasforesta.com

